



### III. TÁBLA.

Rajzok természetes nagyságban, kivéven azokat, melyeknél «phot.» áll.

- |   |  |
|---|--|
| <p><i>Elasmomyces Mattirolianus</i> CAV.<br/>1, 2, kívülről,<br/>3, közepén átmetszve. Felső-Tárkány.</p>   | <p><i>Hymenogaster decorus</i> TUL.<br/>23, két példány, kívülről és közepén átmetszve.<br/>Brassó.</p>  |
| <p><i>Gautieria morchellaeformis</i> VITT.<br/>4, 5, friss példány a myceliumköteggel. Anina.<br/>6, 7, 8, száraz példány, 6 kívülről, 7, 8 közepén átmetszve. Litke.</p> | <p><i>Phlyctospora fusca</i> CDA.<br/>24, 25, kívülről és közepén átmetszve. Brassó.</p>   |
| <p><i>Hysterangium stoloniferum</i> TUL.<br/>9, két példány, kívülről és közepén átmetszve.<br/>Felső-Tárkány.</p>  | <p><i>Octaviania asterosperma</i> VITT.<br/>26, 27, kívülről és közepén átmetszve. Litke.</p>  |
| <p><i>Hysterangium fragile</i> sensu HESSE.<br/>10, két példány kívülről. Rahó.</p>   | <p><i>Octaviania lutea</i> HESSE.<br/>28, kívülről. Litke.</p>   |
| <p><i>Hysterangium Thwaitesii</i> BERK. et BR.<br/>11, 12, 13, kívülről,<br/>14, közepén átmetszve. Stubnya.</p>  | <p><i>Melanogaster variegatus</i> (VITT.) TUL.<br/>29, kívülről,<br/>30, közepén átmetszve. Kecskemét, friss példány, phot.</p>  |
| <p><i>Hysterangium membranaceum</i> VITT.<br/>15, két példány, kívülről és közepén átmetszve.<br/>Brassó.</p>   | <p><i>Melanogaster ambiguus</i> (VITT.) TUL.<br/>31, 32, kívülről,<br/>33, közepén átmetszve. Ó-Bánya.</p>   |
| <p><i>Hysterangium Clathroides</i> VITT.<br/>16, kívülről,<br/>17, közepén átmetszve. Cselnik.<br/>18, két összenőtt példány. Litke.</p>                                  | <p><i>Leucogaster nudus</i> (HAZSL.) HOLL.<br/>34, kívülről,<br/>35, átmetszve. Száraz példányok. HAZSLINSZKY-tól eredő originale. Bártfa.</p>   |
| <p><i>Hymenogaster citrinus</i> VITT.<br/>19, két példány, kívülről és közepén átmetszve.<br/>Piliny.</p>   | <p><i>Rhizopogon rubescens</i> TUL.<br/>36, két friss, fiatal példány, kívülről és közepén átmetszve. Stubnya.<br/>37, két száraz példány, kívülről és közepén átmetszve. Lőcse.<br/>38, két friss, vén példány, kívülről és közepén átmetszve. Kecskemét.</p> |
| <p><i>Hymenogaster lilacinus</i> TUL.<br/>20, két példány, kívülről és közepén átmetszve.<br/>Kecskemét.</p>  | <p><i>Hydnangium carneum</i> WALLR.<br/>39, két száraz példány, kívülről és átmetszve.<br/>Berlin.</p>   |
| <p><i>Hymenogaster tener</i> BERK.<br/>21, két példány, kívülről és közepén átmetszve.<br/>Brassó.</p>  | <p><i>Rhizopogon luteolus</i> FR.<br/>40, két száraz példány kívülről. Berlin.</p>   |
| <p><i>Hymenogaster vulgaris</i> TUL.<br/>22, két példány, kívülről és közepén átmetszve.<br/>Zernest.</p>   |  |